

Pôle communication
Tél. : 24 66 40

Mercredi 24 février 2021

INFO PRESSE

Recrudescence de cas de leptospirose en Nouvelle-Calédonie

La direction des Affaires sanitaires et sociales (DASS) du gouvernement alerte la population sur la recrudescence de cas de leptospirose en Nouvelle-Calédonie. Depuis le début de l'année¹, 86 cas ont été confirmés, dont 20 enfants, soit plus de cas en deux mois que ceux dénombrés sur la totalité de l'année 2020. Parmi ces personnes, 52 ont dû être hospitalisées, dont 16 en réanimation.

La leptospirose est une maladie grave, parfois mortelle, dont le risque de contamination s'accroît en cas de fortes pluies. Elle est causée par une bactérie pathogène qui se trouve principalement dans les urines des rongeurs (rats, souris, cochons d'Inde) ou de mammifères (cerfs, porcs, bovins, chiens). L'urine des animaux contaminés peut polluer l'eau, les environnements humides et tout objet qui entre en contact avec celle-ci. Cette bactérie a la capacité de survivre plusieurs mois dans un milieu humide.

L'homme peut ensuite contracter la maladie, plusieurs fois au cours de sa vie, lorsqu'il entre en contact avec les eaux, les sols et les objets contaminés par l'urine de ces animaux.

C'est pourquoi les Calédoniens sont appelés à adopter de bons réflexes pour ne pas contracter la leptospirose :

- ne pas marcher pieds nus,
- ne pas se baigner en eau douce (rivières, creeks) notamment après de fortes pluies,
- couvrir ses plaies avec des pansements étanches,
- limiter la reproduction des rongeurs (conserver les aliments dans des boîtes fermées, stocker les ordures dans des conteneurs fermés, ramasser les fruits tombés des arbres, dératiser régulièrement).


En cas de symptômes, consultez immédiatement un médecin qui prescrira un traitement antibiotique adapté :

- forte fièvre (supérieure à 39°C),
- douleurs articulaires, musculaires, abdominales,
- forts maux de tête.


Les signes de la maladie apparaissent une à trois semaines après la contamination.

¹ Chiffres DASS-NC au 23 février 2021

Données épidémiologiques



Plus de la moitié des cas sont situés en Province Nord (63 %). Les communes les plus touchées sont Ponérihouen, Païta, Poindimié, Hienghène, Houaïlou, Koné et Ouégoa.



Nombre de cas de leptospirose en Nouvelle-Calédonie de 1997 à 2021

