

CONSEILS À LA PERSONNE VACCINÉE

Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent entraîner des effets indésirables. La majorité des réactions ne sont pas graves et disparaissent rapidement.

QUELS PEUVENT ÊTRE CES EFFETS INDÉSIRABLES ?



Très souvent

(plus d'une
personne sur 10)

- douleur, gonflement à l'endroit où l'injection a été réalisée
- maux de tête, fatigue, fièvre ou frissons
- douleurs aux articulations
- douleurs musculaires

Souvent

(moins d'une
personne sur 10)

- rougeur à l'endroit où l'injection a été réalisée
- nausées

Rarement

(moins d'une
personne sur 100)

- douleurs aux extrémités
- gonflement des ganglions
- insomnies, malaise
- démangeaisons à l'endroit où l'injection a été réalisée

Très rarement



- réactions ou chocs allergiques

Vous pouvez déclarer un effet indésirable en appelant le

 **N° Vert 05 00 33** ou auprès de votre médecin traitant
(une déclaration de pharmacovigilance sera remplie par les professionnels de santé)

QUE FAIRE SI VOUS RESSENTEZ UN OU DES EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) ?



-  Si vous avez une rougeur, une douleur ou un gonflement à l'endroit où l'injection a été réalisée, appliquez-y une compresse humide froide.
-  Si vous avez de la fièvre ou une douleur, vous pouvez utiliser du paracétamol.

CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN SI :



- vous ressentez des effets graves ou qui ne sont pas décrits ci-dessus,
- les effets indésirables s'aggravent au lieu de s'améliorer,
- les effets indésirables durent depuis plus de 48 heures.

En cas de doute, appelez votre médecin traitant ou le



Il est important de continuer de respecter les gestes barrière



Vous venez de vous faire vacciner, parlez-en autour de vous et incitez votre entourage à se protéger !