

## ÉLEVEURS AGISSEZ RAPIDEMENT !

En cas de doute, contactez immédiatement votre vétérinaire.

La DAVAR\*1-SIVAP\*2 doit être prévenue par :

1. Le vétérinaire en cas de doute sur un foyer qu'il gère,
2. Par quiconque en cas de découverte d'un ou plusieurs porcs sauvages morts ou présentant des signes de maladie,

Tél : 24.37.45

Mail : [davar.sivap-sa@gouv.nc](mailto:davar.sivap-sa@gouv.nc)

### MISE SOUS SURVEILLANCE

En cas de suspicion, une mise sous surveillance des élevages sera appliquée ainsi que des mesures de restrictions des mouvements d'animaux ou de matériel.

\*1DAVAR : Direction des Affaires Vétérinaires Alimentaires et Rurales

\*2SIVAP : Service d'Inspection Vétérinaire Alimentaire et Phytosanitaire

### PRÉVENTION ET PLAN D'INTERVENTION

**Dès confirmation, un plan d'intervention est mis en place.**

Ce plan comprend différentes mesures telles que :

1. L'abattage de tous les porcs présents dans l'exploitation
2. L'élimination appropriée des carcasses
3. Le nettoyage et la désinfection des locaux
4. Un vide sanitaire
5. La réalisation d'enquêtes et la recherche du virus dans les autres élevages autour du foyer d'infection
6. L'interdiction des mouvements d'animaux et de produits issus de l'élevage
7. Des mesures d'indemnisation adaptées

### UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

Face à la PPA, nous sommes tous responsables. Il est impératif de mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour prévenir l'introduction du virus et protéger nos élevages.



Pour plus d'informations : [www.gouv.nc/la- peste-porcine-africaine](http://www.gouv.nc/la- peste-porcine-africaine)

# NON À LA PESTE PORCINE AFRICAINNE SUR NOTRE ÎLE!



## PROTÉGEONS NOS COCHONS EN NOUVELLE-CALÉDONIE



GOUVERNEMENT DE LA  
NOUVELLE-CALÉDONIE

# LA PESTE PORCINE AFRICAINE (PPA) :


## UN DANGER IMMINENT POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE !

La **Peste Porcine Africaine (PPA)** représente une menace redoutable pour les élevages porcins à l'échelle mondiale. Son apparition en Asie-Pacifique constitue un risque majeur pour les élevages de porcs en Nouvelle-Calédonie.

### DES CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES

La PPA entraîne des pertes considérables pour les éleveurs. Les animaux infectés succombent presque systématiquement à l'infection, se traduisant par des pertes économiques massives, directes et indirectes.

Les pertes directes comprennent la mortalité et l'abattage des animaux, tandis que les pertes indirectes résultent des restrictions voire de l'arrêt de la production de produits porcins.



### COMMENT PROTÉGER NOS ÉLEVAGES ?




#### NOTRE VIGILANCE EST CRUCIALE

La Nouvelle-Calédonie reste pour l'instant préservée de ce virus, mais la moindre faille dans notre vigilance collective peut être fatale.

Si le virus est inoffensif pour l'homme, il peut décimer nos élevages de cochons.

#### DES PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

Pour préserver nos élevages, évitons :

-  D'importer des produits à base de porc, telle que la charcuterie,
-  De visiter des fermes dans des pays infectés,
-  De pratiquer la chasse dans les pays infectés.

Le virus est extrêmement contagieux et résistant.

**Le virus de la PPA peut survivre dans des denrées alimentaires ainsi que sur les vêtements et chaussures.**






#### Temps de survie du virus de la PPA

Type de sous-produits	Durée de vie du virus
Viande réfrigérée	3 mois
Viande congelée	3 ans
Lard	10 mois
Viandes salées ou séchées	1 à 3 mois
Lisier	3 mois



#### Le virus de la PPA peut être introduit par :








-  De la viande porcine infectée consommée par un porc domestique ou sauvage (exemple : un porc sauvage qui consomme un reste de sandwich au jambon issu d'un pays contaminé)
-  Un contact direct entre un porc domestique et un porc sauvage infecté
-  Un contact indirect avec les sécrétions d'un animal malade (sang, urine, salive, semence...). Ces sécrétions peuvent être présentes sur des vêtements ou du matériel ayant été en contact avec des animaux contaminés



### RECONNAÎTRE LES SIGNES

Il est essentiel de connaître les signes évocateurs de la PPA chez les porcs.

Les signes se traduisent chez les porcs par :

-  Un appétit diminué
-  De la fièvre
-  Une augmentation de la consommation d'eau
-  De l'abattement
-  Un regroupement inhabituel d'animaux
-  Des rougeurs de la peau
-  Des avortements et une mortalité sous la mère