



Point presse Covid-19 – DASS 27 janvier 2022

- Point épidémiologique
- Dépistage
- Point vaccinal

Situation épidémiologique (26/01/2022)

POURSUITE DE L'AUGMENTATION



- Incidence depuis la semaine du 03/01 avec accentuation à la fin de la semaine du 17/01 et du nombre de cas positifs (semaine 1-2 : x 2, semaine 2-3 : x 3 avec plus de 1900 + ; > 1200 depuis le début de la semaine 4).
- Nombre de tests réalisés (cas positifs, personnes contact à risque, voyageurs).
- Taux de positivité des tests.

DÉPISTAGE / CRIBLAGE OMICRON

- Circulation virale active dans pratiquement toutes les communes.
- Criblage systématique des voyageurs positifs jusqu'au 10/01 car tous omicron (bon respect de la réalisation des tests à J2, J7).
- 4/01 : premiers cas locaux omicron non liés à un voyageur.
- 11/01 : criblages centrés sur les cas locaux (omicron >80%).
- Omicron dans 17 communes (Nord, Sud, Îles).
- **Circulation conjointe Delta/Omicron.**

INVESTIGATION des cas positifs omicron pour recherche de contamination

- Clusters (collectivités, entreprises, deuils, activités sociales, repas de famille, repas de travail, collègues partagent le même bureau, séjour avec amis...).



!!! VARIANT OMICRON TRÈS CONTAGIEUX

RESPECT DES MESURES BARRIÈRE ESSENTIEL : BIEN PORTER SON MASQUE

!!! ATTENTION AU RISQUE DE TRANSMISSION EN COLLECTIVITÉ EN L'ABSENCE DE PORT DU MASQUE, notamment en intérieur

Stratégie de dépistage à compter du 1/02/2022


Priorités de dépistage : personnes avec symptômes, PCAR, contrôle des voyageurs arrivant en NC

	TROD ANTIGÉNIQUE	AUTOTEST ANTIGÉNIQUE	
	Prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé	Prélèvement nasal	
		Sous supervision d'un professionnel de santé habilité	Usage sans supervision d'un professionnel de santé
Utilisation à visée diagnostique	<p>Les personnes symptomatiques dans les 4 jours après l'apparition des symptômes</p> <p>Les personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont identifiées comme personnes contact à risque (1^{er} test)</p> <p>Les voyageurs de retour de Métropole ou de l'international</p>	<p>PCAR</p> <p>PN en vol et certaines professions selon protocoles DASS</p> <p>Milieu scolaire</p> <p>Contrôle pour les personnes contact à risque</p> <p>À ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 3 ans</p>	
Indications de prise en charge par la NC	<p>Voyageurs de retour de Métropole ou de l'international</p> <p>Opération de dépistage collectif après déclaration à la DASS</p> <p>Personnes symptomatiques, PCAR</p> <p>Tests Pré op/ pré chimio</p>	<p>Enfants de 3-15 ans, personnes contact à risque ou symptomatiques</p>	
Indications NON PEC, payantes pour la personne	<p>Départ voyage vers métropole/ Pf/ international</p> <p>Déplacement inter îles</p> <p>Pass sanitaire</p>	<p>Pass sanitaire</p>	<p>Payant (non pris en charge)</p>

Concernant les PCR :

- Elles seront réservées aux personnes vulnérables (selon la liste définie par arrêté) et aux personnes hospitalisées, aux voyageurs sortants selon la réglementation du pays d'accueil.
- Elles seront prises en charge par la Nouvelle-Calédonie, **uniquement dans le cadre du réseau sentinelle (santé publique) et pour les raisons médicales ci-dessus, sur présentation d'une ordonnance.**
- Elles seront **payantes** pour les **voyageurs** (international, inter-îles) et pour le **pass sanitaire**.

Bilan vaccination (26/01/2022)



	Au moins 1 dose	Schéma complet
Population ≥ 5 ans	72 %	67 %
Population ≥ 12 ans	81 %	76 %




Schéma vaccinal complet : définitions

Définition du schéma vaccinal complet selon les situations :

Définition médicale	Pass sanitaire activité actif	Conditions pour rentrer en Nouvelle-Calédonie
<p>Primovaccination* + dose de rappel (selon la date de la dernière injection)</p> <p>Il faut se référer aux recommandations émises par la DASS à destination des professionnels de santé (réf. COVID19-2022-DASS-94157V2 du 19/01/2022)</p>	<p>Vaccins à ARNm : 2 doses dont la 2^e dose remonte à moins de 7 mois</p> <p>ou 2 doses + 1 dose de rappel faite dans un délai de 3 à 7 mois après la 2^e dose**</p>	<p>Vaccins à ARNm : 7 jours après l'injection de la 2^e dose</p>
	<p>Janssen : 1 dose de Janssen + 1 dose complémentaire avec un vaccin à ARNm dans un délai de 1 à 2 mois après la 1^{re} injection</p> <p>Un rappel avec un vaccin à ARNm doit être fait dans un délai de 7 mois après la dose complémentaire.</p>	<p>Janssen : 28 jours après l'injection de la 1^{re} dose</p>
	<p>Autres vaccins reconnus par l'OMS : schéma complet + 1 dose de vaccin à ARNm</p>	<p>Autres vaccins reconnus par l'OMS : schéma complet + 1 dose de vaccin à ARNm</p>
	<p>Antécédent Covid : certificat de rétablissement valide de 11 jours à 6 mois après la réalisation d'un test positif</p>	<p>Antécédent Covid : antécédent Covid + 1 dose de vaccin à ARNm</p>

*1 à 2 doses selon le type de vaccin ou les antécédents de Covid.

**Si la dose de rappel est faite après ce délai, le pass sanitaire sera actif après un délai de carence de 7 jours suite à l'injection de la dose de rappel.

Stratégie vaccinale

CONTEXTE :

- co-circulation delta et omicron;
- pénurie de personnels de santé;
- pass sanitaire (évolution vers le pass vaccinal ?).

3 NOUVELLES PRIORITÉS :

- rappel 3^e dose;
- personnes vulnérables;
- personnes non vaccinées.

DOSE DE RAPPEL :

- dès 3 mois après 2^e dose de vaccin Pfizer;
- personnes de plus de 18 ans et enfants à partir de 12 ans si facteurs de risque;
- au 17/01/22 : 52 229 personnes ont eu une dose de rappel sur les 176 202 personnes ayant reçu 2 doses;
- 20 000 personnes éligibles à la dose de rappel à 6 mois;
- 90 000 personnes éligibles à la dose de rappel à 3 mois.

PERSONNES VULNÉRABLES :

- personnes de plus de 60 ans : 80 % ont schéma vaccinal complet;
- personnes de plus de 65 ans : 83 % ont schéma vaccinal complet;
- sur les 30 000 personnes avec comorbidités identifiées : 7000 n'ont pas de schéma complet.

Stratégie vaccinale

CONVAINCRE LES PERSONNES NON-VACCINÉES :

- 12-17 ans : 8080 personnes sur 24 643;
- plus de 18 ans : 35 906 personnes sur 206 757;
- plus de 65 ans : 4 210 personnes sur 31 723.

FEMMES ENCEINTES :

- vaccination recommandée dès le 1^{er} trimestre de grossesse (primo-vaccination et dose de rappel).

VACCINATION DES ENFANTS DE 5-11 ANS (28 570 enfants) :

- a débuté depuis le 10 janvier;
- autorisation écrite des 2 parents, même si un seul parent est présent lors de la vaccination.